



中國醫藥大學附設醫院
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地址：台中市育德路 2 號

電話：(04)22052121-13154

藥劑快訊

本期目次

一、藥委會-新刪藥公告(P1)

1. 新進品項
2. 停用品項

二、藥品異動資訊 (P3)

1. 臨時採購
2. 更換廠牌
3. 包裝異動

三、預防用藥疏失--易混淆/形音相似藥品 (P11)

1. 外觀相似

四、藥物安全警訊 (P12)

1. TFDA 藥品安全資訊風險溝通表
 - (1) 含 tolperisone 成分藥品安全資訊風險溝通表
 - (2) 含 ascorbic acid 單方成分注射劑型藥品安全資訊風險溝通表

一、藥委會-新刪藥公告

1. 新進品項(共 27 項)


| 項次 | 商品名 | 學名規格 | 廠牌 |
|----|----------------------------|--|----------|
| 1 | Abiratanat 250mg/Tab | Abiraterone Acetate 250mg/Tab | 健喬信元 |
| 2 | Alprosm Lyophilized Powder | Alprostadil (PGE1)20mcg/Vial | 杏林新生/東生華 |
| 3 | Euricon 100mg/Tab | Benzbromarone 100mg/Tab | 健喬信元 |
| 4 | Bisadyl E.C. 5mg/Tab | Bisacodyl 5mg/Tab | 明德/東竹 |
| 5 | Buporin 150mg/Tab | Bupropion XL 150mg/Tab | 瑞安委健喬信元 |
| 6 | Burotam 2 g/Vial (複方) | Cefoperazone / Sulbactam sodium 2 g/Vial | 永信 |
| 7 | Clobetasol Ointment | Clobetasol oint 0.05% 25gm/Tube | 杏輝 |
| 8 | Desora 5mg/Tab | Desloratadine 5mg/Tab | 優生 |
| 9 | Nolbaxol 20mg/mL/Vial | Docetaxel 20mg/ mL/Vial | 永信 |
| 10 | Nolbaxol 80mg/ mL/Vial | Docetaxel 80mg/ mL/Vial | 永信 |
| 11 | Duta 0.5mg/Cap | Dutasteride 0.5mg/Cap | 五洲/歐美 |
| 12 | Kimodin 20mg/Tab | Famotidine 20mg/Tab | 健喬信元 |
| 13 | Forliton | Febuxostat 80mg | 南光 |
| 14 | Fusidic Acid Cream | Fusidic 2% 15gm/Tube | 杏輝 |
| 15 | Kytril 1mg/Tab | Granisetron 1mg/Tab | 大昌華嘉 |
| 16 | Irinotel 100mg/5mL/Vial | Irinotecan 100mg/5mL/Vial | 費森尤斯卡比 |
| 17 | Kinpomin for IV Infusion | L-Alanyl-L-Glutamine 200mg/mL/100mL | 南光 |
| 18 | Lefoxin eye drops 0.5% | Levofloxacin Oph. sol'n 25mg/5mL/Bot | 麥迪森 |
| 19 | Anxiedin 0.5mg/Tab | LoraZepam 0.5mg/Tab | 優良委健喬信元 |
| 20 | Midatin 5mg/mL/3mL | Midazolam 5mg/mL/3mL | 南光 |
| 21 | Ketoshine Topical Solution | Minoxidil 50mg/60mL/ Bot | 杏輝 |
| 22 | Olan ODT 10mg/Tab | Olanzapine zydis 10mg/Tab | 中化裕民 |
| 23 | Olan ODT 5mg/Tab | OlAnZaPiNe zydis 5mg/Tab | 中化裕民 |
| 24 | Stothu 0.25mg/5mL/Vial | Palonosetron 0.25mg/5mL/Vial | 永信 |
| 25 | Zecolin 250mg/Cap | Tranexamic Acid 250mg/Cap | 元宙 |
| 26 | Valgovir 450mg/Tab | Valganciclovir 450mg/Tab | 諾華/一航 |
| 27 | Rafax XR 75 mg/Tab | Venlafaxine SR 75mg/Cap | 中化裕民 |

2. 停用品項(共 34 項)(公告用罄即不再續採購，以藥庫通知為準)



| 項次 | 商品名 | 學名規格 | 廠牌 |
|----|--------------------------|--|--------|
| 1 | Zytiga 250mg/Tab | Abiraterone Acetate 250mg/Tab | 嬌生 |
| 2 | Promostan 20mcg/Vial | Alprostadil(PGE-1) 20mcg/Vial | 中化裕民 |
| 3 | Nogout 100mg/Tab | Benzbromarone 100mg/Tab | 杏輝 |
| 4 | Dulcolax 5mg/Tab | Bisacodyl 5mg/Tab | 大昌華嘉 |
| 5 | Wellbutrin XL 150mg/Tab | Bupropion XL 150mg/Tab | 葛蘭素 |
| 6 | Vocabria 600mg/3mL/Vial | Cabotegravir 600mg/3mL/Vial (暫緩臨採) | 葛蘭素 |
| 7 | Brosym 2 g/Vial (複方) | Cefoperazone / Sulbactam sodium 2 g/Vial | 東洋 |
| 8 | Clobetasol oint /Tube | CloBETasol oint 0.05% 7gm/Tube | 杏輝 |
| 9 | Delstrigo (三合一) | Delstrigo 100/300/300mg Tab | 默沙東 |
| 10 | Prolia 60mg/mL/Syringe | DENOSUMAB 60mg/mL/Syringe | 安進 |
| 11 | Denosin 5mg/Tab | Desloratadine 5mg/Tab | 美時 |
| 12 | TAXotere 20mg/mL/Vial | DOCEtaxel 20mg/mL/Vial | 賽諾菲 |
| 13 | TaXoTeRe 80mg/4mL/Vial | DoCeTaXeL 80mg/4mL/Vial | 賽諾菲 |
| 14 | Avodart 0.5mg/Cap | Dutasteride 0.5mg/Cap | 葛蘭素 |
| 15 | Famotidine F.C. 20mg/Tab | Famotidine 20mg/Tab | 中化裕民 |
| 16 | Feburic F.C. 80mg/Tab | Febuxostat F.C. 80mg/Tab | 安斯泰來 |
| 17 | FUSIdic Acid cream 2% | FUSIdic Acid cream 2% 5gm/Tube | 杏輝 |
| 18 | Setron F.C. 1mg/Tab | Granisetron 1mg/Tab | 佳祿 |
| 19 | Bonviva 3mg/3mL/Syringe | IBANDRONATE 3mg/3mL/Syringe | 吉興 |
| 20 | Campto 100mg/5mL/Vial | Irinotecan 100mg/5mL/Vial | 輝瑞轉文德 |
| 21 | Dipeptiven 20g/100mL/Bot | L-Alanyl-L-Glutamine sol'n 20g/100mL/Bot | 費森尤斯卡比 |
| 22 | Cravit Oph. sol'n/Bot | Levofloxacin Oph. sol'n 25mg/5mL/Bot | 參天 |
| 23 | Ativan 0.5mg/Tab | Lorazepam 0.5mg/Tab | 輝瑞 |
| 24 | Dormicum 15mg/3mL/Amp | Midazolam 15mg/3mL/Amp | 大昌華嘉 |
| 25 | Folux foaming 5% | Minoxidil 5% 90mL/BT | 台田 |
| 26 | Zyprexa 10mg/Tab | Olanzapine 10mg/Tab | 禮來 |
| 27 | ZyPrExA 5mg/Tab | OlAnZaPiNe zydis 5mg/Tab | 禮來 |
| 28 | Aloxi 0.25mg/5mL/Vial | Palonosetron 0.25mg/5mL/Vial | 吉興 |
| 29 | Rekambys 900mg/3mL/Vial | Rilpivirine 900mg/3mL/Vial (暫緩臨採) | 葛蘭素 |
| 30 | Evenity 105mg/Amp | Romozumab 105mg/Amp | 安進 |
| 31 | Forteo for inj | Teriparatide 600mcg/2.4mL/Pen | 禮來/裕利 |
| 32 | Transamin 250mg/Cap | Tranexamic Acid 250mg/Cap | 第一三共 |
| 33 | Valcyte 450mg/Tab | Valganciclovir 450mg/Tab | 裕利 |
| 34 | Efexor XR 75mg/Cap | Venlafaxine HCL 75mg/Cap | 暉致 |



二、藥品異動資訊

1. 臨時採購


| | | |
|-------|---|--|
| 日期 | 114.02.20 |  |
| 學名/規格 | Epcoritamab 48mg/0.8 mL | |
| 商品名 | Epkinly Solution for Injection 艾可來注射劑 48 毫克/0.8 毫升 | |
| 適應症 | <p>1. 瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤 (DLBCL)：適用於治療先前曾接受至少兩線全身性治療之復發性或難治性瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤 (DLBCL) 的成人病人。</p> <p>2. 濾泡性淋巴瘤 (FL)：適用於治療先前曾接受至少兩線全身性治療之復發性或難治性濾泡性淋巴瘤 (FL) 的成人病人。</p> | |
| 備註 | 血液腫瘤科臨採品項 | |

2. 更換廠牌



| | | | |
|-------|---|--|---------|
| 日期 | 113.02.17 | 變更項目 | 應元廠變榮民廠 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  |  | |
| 學名/規格 | Diphenhydramine HCl 30 mg/mL/Amp | | |
| 商品名 | Diphenhydramine Hydrochloride Inj. "Y.Y." "應元"鹽酸二苯胺明注射液 | Benamine Injection "榮民"去敏注射液 | |
| 適應症 | 過敏性疾患、蕁麻疹、皮膚炎、溼疹 | 過敏性疾病、蕁麻疹、美尼攸氏病、暈動病 | |
| 備註 | 原品項缺貨，進用暫代。 | | |

| | | | |
|-------|---|--|---------|
| 日期 | 114.02.24 | 變更項目 | 永信廠變濟生廠 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  |  | |
| 學名/規格 | Ketorolac tromethamine 30mg/mL/Amp | | |
| 商品名 | Kerolac Injection 刻痛治注射液 | KOP Injection 克痛寶注射液 | |
| 適應症 | 短期(≤5天)使用於緩解無法口服病人之中重度急性疼痛，通常使用於手術後 | | |
| 備註 | 原品項缺貨，進用暫代。 | | |



| | | | |
|-------|--|------|------|
| 日期 | 114.02.24 | 變更項目 | 增濟生廠 |
| 圖片 | 新增 | | |
| |  | | |
| 學名/規格 | Dextrose monohydrate 5% 500mL/Bot | | |
| 商品名 | 5% GLUCOS INJECTION "CHI SHENG" "濟生"克力糖注射液 5% | | |
| 適應症 | 營養減退及衰弱、循環障礙、腦出血 | | |
| 備註 | 原品項缺貨，進用暫代 | | |



| | | | |
|-------|--|--|---------|
| 日期 | 114.02.26 | 變更項目 | 應元廠變台裕廠 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  | | |
| |  | | |
| 學名/規格 | Each Amp Contains: Niacinamide 30 mg, Thiamine HCl 60 mg, Riboflavin phosphate sodium 3 mg, Pyridoxine HCl 3 mg. | Each Amp Contains: Niacinamide 50 mg, Thiamine HCl 100 mg, Riboflavin 5 mg, Pyridoxine HCl(Vit. B6) 2 mg, Dexpanthenol 5 mg. | |
| 商品名 | B-COMPLEX INJECTION "Y.Y." 複合維生素-B 注射液 | B-COMPLEX INJECTION "TAI YU" "台裕"複方維他命 B 注射液 | |
| 適應症 | 腳氣病之治療與預防、食慾不振、神經炎、營養之補給、皮膚炎、溼疹、妊娠惡阻。 | 腳氣病、神經炎、多發性神經炎、口角炎、皮膚炎、維他命 B 缺乏之預防及治療。 | |
| 備註 | 原品項缺貨，進用替代。 | | |

3. 包裝異動



| | | | |
|-------|---|--|------|
| 日期 | 114.02.18 | 變更項目 | 標籤變更 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  |  | |
| 學名/規格 | Dopamine 200mg/5mL/Amp | | |
| 商品名 | Dopamin Injection 得保命注射液 | | |
| 適應症 | 休克症候群及心臟衰竭 | | |



| | | | |
|-------|---|--|--------|
| 日期 | 114.02.24 | 變更項目 | 片裝大小變更 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  |  | |
| 學名/規格 | Azilsartan medoxomil 40mg/Tab | | |
| 商品名 | Edarbi Tab 易得平錠 | | |
| 適應症 | 治療高血壓 | | |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| 日期 | 114.02.26 | 變更項目 | 片裝印刷變更 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  |  | |
| 學名/規格 | Gefitinib 250 mg/Tab | | |
| 商品名 | Iressa film-coated tablets 250mg 艾瑞莎膜衣錠 250 公絲 | | |
| 適應症 | IRESSA 適用於先前已接受過化學治療後，但仍局部惡化或轉移之肺腺癌病患之第二線用藥。IRESSA 適用於具有 EGFR-TK 突變之局部侵犯性或轉移性之非小細胞肺癌(NSCLC)病患之第一線治療。 | | |



| | | | |
|-------|--|--|--------|
| 日期 | 114.02.26 | 變更項目 | 片裝印刷變更 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  |  | |
| 學名/規格 | Topiramate 50 mg | | |
| 商品名 | Trokendi XR extended-release capsules 50mg 妥偏停持續性釋放膠囊 50 毫克 | | |
| 適應症 | 1.用於成人及六歲以上兒童局部癲癇、併有 LENNOX-GASTAUT 症候群之癲癇或 原發性全身性強直陣攣癲癇的輔助治療 2.用於成人及六歲以上兒童局部癲癇 (PARTIAL ONSET SEIZURE) 之單一藥物治療 3.用於 12 歲以上患者之預防性偏頭痛 | | |

| | | | |
|-------|---|--|------|
| 日期 | 114.03.05 | 變更項目 | 外盒變更 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  |  | |
| 學名/規格 | Testosterone Undecanoate 1000 mg/ 4 ml | | |
| 商品名 | Nebido solution for injection 耐必多注射劑 | | |
| 適應症 | 經臨床徵象及實驗室檢驗確認因睪固酮缺乏之男性生殖腺功能不足症(hypogonadism)的替代治療。 | | |

| | | | |
|-------|---|--|------|
| 日期 | 114.03.06 | 變更項目 | 標籤變更 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  |  | |
| 學名/規格 | Vasopressin 20 Unit/mL/Amp | | |
| 商品名 | Pitressin Injection 必壓生注射液 | | |
| 適應症 | 食道靜脈曲張出血，尿崩症，手術後腹部膨脹，排除腹部氣影。 | | |

| | | | |
|-------|---|--|------|
| 日期 | 114.03.10 | 變更項目 | 片裝變更 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  |  | |
| 學名/規格 | Pancreatin 300mg/Cap | | |
| 商品名 | Creon 25000 卡利消腸溶微粒膠囊 25000 | | |
| 適應症 | 治療兒童及成人因囊狀纖維化症(Cystic Fibrosis, CF)、慢性胰臟炎及胰臟手術等情況所引起的胰液分泌不全 | | |

| | | | |
|-------|---|---|------|
| 日期 | 114.03.19 | 變更項目 | 外盒變更 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  |  | |
| 學名/規格 | Leuprorelin acetate 22.5mg/Syringe | | |
| 商品名 | Eligard 22.5 mg, powder and solvent for solution for injection 癌立佳持續性藥效皮下注射劑 | | |
| 適應症 | 用於晚期前列腺癌紓解治療，以及與放射治療併用於高風險的局部和局部晚期荷爾蒙依賴型前列腺癌治療。 | | |

| | | | |
|-------|--|---|------|
| 日期 | 114.03.20 | 變更項目 | 外盒變更 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  |  | |
| 學名/規格 | Immunoglobulin human 2.5g/25 mL/ViaL | | |
| 商品名 | GAMUNEX-C 凱銘斯免疫球蛋白注射液 10% | | |
| 適應症 | <p>1、作為兒童、青少年及成人之補充療法，用於：(1)原發性免疫缺陷症候群 (PID) 伴隨抗體生成不良。(2)繼發性免疫缺乏疾病 (SID)，病人有嚴重或復發性感染、抗微生物治療無效，且已證實特定抗體缺乏(PSAF)*或血清 IgG 濃度<4g/L。*PSAF= 對於肺炎鏈球菌多醣體和多肽抗原疫苗，IgG 抗體效價的增幅無法達到至少 2 倍。2、麻疹暴露前/後的預防性用藥，用於禁止或不建議接受主動免疫、容易罹病的兒童、青少年及成人。3、作為兒童、青少年及成人之免疫調節，用於：(1)原發免疫性血小板低下症 (Immune thrombocytopenia, ITP)，病人出血風險高，或在手術前矯正血小板計數。(2)格林 - 巴利症候群(Guillain-Barré Syndrome, GBS)。(3)川崎氏症(Kawasaki Disease, KD) (併用乙醃水楊酸)。(4)慢性脫髓鞘多發性神經炎 (Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, CIDP)。(5)多病灶運動神經病變(Multifocal Motor Neuropathy, MMN)。4、作為成人之免疫調節，用於：重症肌無力惡化(Myasthenia Gravis exacerbations, MG)。</p> | | |

三、預防用藥疏失-混淆/形音相似藥

1. 外觀相似

| | | |
|--------------|--|--|
| <p>圖片</p> | | |
| <p>學名規格</p> | <p>Diphenhydramine HCL(抗組織胺)30mg/Amp</p> | <p>Prochlorperazine(針劑) 5mg/mL/Amp</p> |
| <p>中文商品名</p> | <p>去敏注射液</p> | <p>諾安命注射液</p> |
| <p>商品名</p> | <p>Benamine 30mg/Amp</p> | <p>Novamin 5mg/mL/Amp</p> |

| | | |
|--------------|---|--------------------------------|
| <p>圖片</p> | <p style="color: red; text-align: center;">顏色相近、條碼面接近100%一樣</p> | |
| <p>學名規格</p> | <p>Haloperidol 5mg (針劑) /mL/Amp</p> | <p>Famotidine 20mg/2mL/Amp</p> |
| <p>中文商品名</p> | <p>易寧優注射液</p> | <p>胃潰定 注射液</p> |
| <p>商品名</p> | <p>Binin-U 5mg/1mL/Amp</p> | <p>Ulcertin 20mg/2mL/Amp</p> |

四、藥物安全警訊

1. TFDA 藥品安全資訊

(1)含 tolperisone 成分藥品安全資訊風險溝通表

因未有充分證據支持含 tolperisone 成分藥品用於治療疼痛性肌痙攣之臨床效益，且該成分藥品具潛在之立即性嚴重全身過敏反應風險，本署經彙集國內、外相關資料及臨床文獻報告進行整體性評估，決議限縮該成分藥品適應症。

- i. 臨床研究與上市後案例資料顯示目前並無充分證據支持含 tolperisone 成分藥品用於治療疼痛性肌痙攣之臨床效益。另，使用含 tolperisone 成分藥品可能發生立即性全身過敏反應，雖多數過敏反應為輕微至中度，惟國際間仍有危及生命之立即性全身過敏反應或過敏性休克 (anaphylactic reactions/shock) 通報案例。
- ii. 瑞士 Swissmedic 曾評估含 tolperisone 成分藥品之安全性與療效後，於 2024 年 5 月限縮該成分藥品之適應症為「成人腦脊髓損傷所致之肌張力異常升高」。

醫療人員應注意事項：

- i. 我國含 tolperisone 成分藥品適應症修訂為「成人腦脊髓損傷所致之肌張力異常升高」，處方前應審慎評估病人用藥之風險效益及是否符合適應症使用。
- ii. Tolperisone 上市後使用經驗中最常被通報之不良反應為過敏反應，範圍從輕微皮膚反應至嚴重全身性反應（如過敏性休克），其症狀可能包含紅斑、皮疹、蕁麻疹、搔癢、血管性水腫、心跳加快、低血壓或呼吸困難等。
- iii. 女性、年長者、併用 NSAIDs、有藥品過敏史或患有過敏性疾病、或同時有病毒感染情形之病人可能有較高的過敏反應風險。此外，已知對 lidocaine 過敏之病人使用 tolperisone 應更加謹慎，因可能有交叉過敏反應的風險。
- iv. 曾使用 tolperisone 發生過敏反應的病人，不可再投予此藥。
- v. 應告知病人使用 tolperisone 可能的過敏反應風險，並提醒病人若出現任何過敏相關症狀，應立即停藥並就醫治療。

本院現況與民眾應注意事項：

- i. Tolperisone 具有嚴重且可能危及生命的過敏反應風險，且已知對 lidocaine 過敏者可能更易引發 tolperisone 過敏風險。若您有 tolperisone 或 lidocaine 過敏史，就醫時請告知醫療人員。
- ii. 過敏的早期徵兆包含：潮紅、皮疹、皮膚劇烈搔癢（伴隨凸起的腫塊）、喘鳴、呼吸困難（可能伴隨臉部、嘴唇、舌頭或咽喉腫脹）、吞嚥困難、心跳快速、低血壓、血壓快速下降等，如果您服藥期間出現上述症狀，應立即尋求醫療協助。

iii. 若對於用藥有任何的疑問或疑慮，請諮詢醫療人員。

本院含高劑量 tolperisone 成份之藥品：

| 藥品代碼 | 商品名 | 成份名 | 中文商品名 |
|----------|-------|--------------------------|--------|
| TTOLPER1 | Topee | Tolperisone(F) 150mg/Tab | 肌鬆定膜衣錠 |

(2)含 ascorbic acid 單方成分注射劑型藥品安全資訊風險溝通表

全國藥物不良反應通報中心接獲疑似因使用高劑量 ascorbic acid 導致草酸鹽腎病變及急性腎衰竭之嚴重不良反應通報案例。

- i. 全國藥物不良反應通報中心接獲疑似使用高劑量 ascorbic acid 導致草酸鹽腎病變及急性腎衰竭，甚至死亡之嚴重不良反應通報。
- ii. Ascorbic acid 在人體的最終代謝產物為草酸，由尿液排出。長時間以注射方式使用高劑量的 ascorbic acid 會使尿液酸化，引起半胱胺酸(cysteine)、尿酸及草酸等物質形成結石沉澱，進而可能導致急性或慢性的草酸鹽腎病變。
- iii. 具有腎臟疾病、草酸鹽腎結石病史、年長者及 2 歲以下兒童，使用 ascorbic acid 後發生草酸鹽腎病變的風險可能增加。此類較高風險病人不建議長期使用。
- iv. 目前以高劑量 ascorbic acid 作為癌症輔助治療、緩解癌症相關疲倦之療效尚未確立，如需長時間使用高劑量 ascorbic acid 治療，應審慎評估用藥的風險及效益

醫療人員應注意事項：

- i. 國內曾接獲長期注射高劑量的 ascorbic acid 引發急性或慢性草酸鹽腎病變之個案報告，嚴重時可能導致腎衰竭。
- ii. 具有腎臟疾病、草酸鹽腎結石病史、年長者及 2 歲以下兒童為發生草酸鹽腎病變之高風險族群，處方 ascorbic acid 前應謹慎評估病人用藥的風險效益，並監測此類有較高風險病人之腎功能。若病人發生草酸鹽腎病變，應評估停止 ascorbic acid 治療。
- iii. Ascorbic acid 作為癌症輔助治療、緩解癌症相關疲倦之療效尚未確立，倘需處方高劑量的 ascorbic acid，應審慎評估用藥之風險及效益，並告知病人可能的草酸鹽腎結石風險，及監控其腎功能。

本院現況與民眾應注意事項：

- i. 曾有長期注射高劑量的 ascorbic acid (維生素 C)後發生腎結石及其他腎臟病變的案例，且有腎臟疾病或腎結石的病人、高齡者及 2 歲以下兒童可能會增加風險。

- ii. 若有腎臟相關疾病，就醫時應主動告知醫療人員。若治療期間發生尿量或解尿頻率改變、解尿困難、肢體水腫、血尿、下背痛、腹痛等症狀，請立即尋求醫療協助。
- iii. 若對於藥品有任何的疑問或疑慮，請諮詢醫療人員。

本院含 ascorbic acid 單方成分注射劑型之藥品：

| 藥品代碼 | 商品名 | 成份名 | 中文商品名 |
|---------|----------|--|--------|
| IVITA20 | PanNobel | Vitamin C(Ascorbic acid) 5000mg/20mL/Amp | 諾貝爾注射液 |